

## AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELL'ACCESSO A SCUOLA DELLO STUDENTE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

\_\_I\_\_ sottoscritt\_\_ \_\_\_\_\_, nat\_\_ a  
\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di  
genitore/tutore dell\_\_ student\_\_ \_\_\_\_\_,

- ⇒ consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti;
- ⇒ consapevole del divieto, in presenza di determinate condizioni, più sotto specificate, di accedere nell'edificio scolastico e del conseguente obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, sanciti dalla normativa vigente;
- ⇒ nonché consapevole della responsabilità personale e dell'importanza dell'adesione alle regole stabilite dalla normativa vigente e dal Protocollo scolastico, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19;

**DICHIARA, AI FINI DELL'ACCESSO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO, CHE L\_\_ STUDENT\_\_ SUDETT\_\_**

- non presenta febbre o altri sintomi suggestivi di COVID-19\* e non li ha presentati nei tre giorni precedenti;
- non è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero non è risultato positivo al COVID-19 o, se risultato positivo, è in possesso di certificato di guarigione (da allegare alla presente);
- non è stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria conoscenza, nei precedenti 14 giorni.

Allegare fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

\* Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020

*“Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”*